



HRVATSKA
POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKA
SAVJETODAVNA SLUŽBA

DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA

PODRUŽNICA KORČULA- LASTOVO

OBAVIJEŠT MASLINARIMA!

Nepovoljni klimatskih uvjeti tijekom ove zime stvorili su uvjete za razvoj i infekciju najčešćih uzročnikom bolesti maslina – paunovim okom (*Spilocaea oleagina*). Porast dnevnih temperatura s povremenim oborinama povoljno će uvjetovati na daljnje širenje bolesti. Iako zasad nema vidljivih simptoma zaraze na lišću uputno je u narednom periodu napraviti zaštitu jednim od pripravaka: Stroby WG, Nativo WG ili Difcor.

U maslinicima nakon rigoroznije rezidbe poželjno je zaštitu napraviti jednim od pripravaka na osnovi bakra (Cuprablau –Z, Neoram WG, Nordox 75 WG) zbog dezinfekcijskog djelovanja na rane i preventivne zaštite od uzročnika bakterijskog raka (*Pseudomonas syringae* pv. *savastanoi*).

Kod primjene bakrenih sredstava na stablima zaraženim paunovim okom moguća je pojava tzv. bakrenog šoka koji se očituje u masovnom opadanju zaraženog lišća.

Pripravke primijeniti prema uputi na etiketi!

Svako tretiranje je potrebno zabilježiti u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu zbrinuti na pravilan način.



HRVATSKA
POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKA
SAVJETODAVNA SLUŽBA

DUBROVAČKO –NERETVANSKA ŽUPANIJA
PODRUŽNICA KORČULA- LASTOVO

OBAVIJEST VINOGRADARIMA!

Oborine koje su padale proteklih dana pogodovati će razvoju i infekcijama uzročnikom crne pjegavosti rozgve (*Phomopsis viticola*) na vinovoj lozi .

Na položajima i sortama gdje se vinova loza nalazi u razvojnem stadiju bubreњa pupova ili vunastog pupa usmjerenu zaštitu preporučamo napraviti jednim od pripravaka na osnovi bakra: Bordoška juha, Caffaro WP, Bordoška suspenzija, Champion WP, Cuprablau - Z, Champion SC ,Cuprablau –Z Ultra, Nordox 75 WG ili Neoram WG.

Radi suzbijanja prezimljujućih oblika štitastih uši i crvenog pauka bakrenom pripravku je uputno dodati mineralno ulje (Bijelo ulje ,Ovipron Top EC ili Mineralno svjetlo ulje) ili koristiti gotovu tvorničku kombinaciju bakra i mineralnog ulja (Modro ulje ili Crveno ulje).

Radi smanjenja populacije lozinih grinja bakrenom pripravku je moguće dodati topivi sumporni pripravak u povišenoj koncentraciji , ali se u tom slučaju ne smiju dodavati mineralna ulja.

Preventivnu zaštitu potrebno je napraviti za mirnog vremena pridržavajući se uputa na etiketi sredstva za zaštitu bilja. Svako tretiranje evidentirati, a ambalažu zbrinuti na propisan način!

12.04.2018.

HPSS PODRUŽNICA KORČULA -LASTOVO